

假单胞菌感染通常由常见的细菌种类引起。铜绿假单胞菌可能引起眼睛，皮肤，肌肉，肺和其他组织的感染。对铜绿假单胞菌感染特异性的一种症状是感染区域中或周围的绿 - 蓝脓。如果假单胞菌感染通过血液传播（即败血症），工人可能因发热，发冷，混乱，休克甚至死亡而变得非常恶心。这种细菌已经对许多抗生素产生抗性，这可能使其难以治疗。



图 2.带保护罩的洗眼液。

军团菌是一种在自然中存在的与变形虫一起存在的细菌，并且可引起严重的肺部感染。例如，由于棘阿米巴是军团菌的有效宿主，所以它们都可能存在于污染的水中。虽然军团菌不会引起眼部感染，但吸入含有细菌的水滴可以引起军团病，一种严重的致命形式的肺炎。免疫系统受损的工人，55 岁以上的工人或具有早期肺病的工人（例如慢性阻塞性肺病（COPD））更容易感染。出现军团病症状暴露后 2 至 14 天，包括咳嗽，呼吸困难，高烧，肌肉疼痛和头痛，常常需要住院治疗。详细细节请联系上海红安安全防护用品有限公司。

上海红安安全防护用品有限公司

官网：[www.shhaxyq.com](http://www.shhaxyq.com)

热线：021-6920-8858